




K.O 黑勢力

防護戰




教育部

廣告

任務編號:小黑蚊K.O防護戰

夏天到啦!
收到小黑蚊K.O
防護戰任務!

小黑蚊不是蚊子，但被叮
咬可能造成強烈搔癢感或
過敏反應！太嚴重啦！
讓我們趕緊準備出動！



小黑蚊的一生

小黑蚊有很多化名！
有人叫他黑微仔、
小金剛

臺灣鈹蠓
(*Forcipomyia taiwana*)




牠是完全變態的昆蟲

生長期分成 卵、幼蟲、蛹到成蟲

牠的卵只要3~6天就能孵化為幼蟲。

蛹期約3~5天，會隱藏在土表的縫隙不用吃也不會動



嗜吸人血的**雌成蟲**

壽命2~6週


吸血後2~4天即可在潮濕的土表隙縫產卵

每次約24~35粒卵

雄成蟲則交配後不久死亡。



開箱小黑蚊的家



白天出動？嗜吸人血的小黑蚊

聽說牠在連續降雨後，晴天無風日子，雌成蟲會大量出現。

挑天氣

這樣的話，剛好在梅雨或端午節以後，就是小黑蚊危害的時間啦！

沒錯！牠們白天就會出動吸血，特別中午12~14時他們活動力最強！

挑時間

那要等黃昏後才會慢慢停止，天黑之後停止吸血活動。

小心！小黑蚊出沒

在學童容易聚集的地方飽餐

校園

鄰近公園

遊樂園及風景區

觀光農園與果園

社區廟口



感應到人的氣味時才會起飛
前往吸血，而且通常在有遮
蔭空間的1公尺以下低飛。

主要吸食人血，吸血時間
約3~5分鐘，吸血時沒有
疼痛感，不易察覺。



請你跟我這樣做 4合1大作戰



種植密生草種並進行管理，
如蔓花生、地毯草等



定期清除地表青苔、藻類與腐植質，
減少適合幼蟲生長環境



周遭環境保持通風乾燥，
拆除不必要的圍籬或遮蔭棚等



維持良好排水，清理排水設施
或溪溝兩岸的淤泥與雜草。
定期疏伐植栽枝葉，保持通風與陽光照射



保護自己 基礎篇

！做好準備

穿

減少身體裸露部位。
穿淡色之長袖衣褲+厚襪子



塗

適當塗抹防蚊藥品



走


時常保持走動狀態



? 萬一被咬怎麼辦？

水+冰

用水沖洗，再冰敷或塗抹消腫止癢藥膏，
減輕紅腫熱痛等不適感




不抓

避免抓破皮膚引發細菌感染，
傷勢嚴重或過敏反應者應盡速就醫




保護大家 校園防護進階篇

校園預防小黑蚊有3寶




細孔紗窗(門)

安裝32目之細孔紗門、
紗窗強化通風



搭配立扇保持通風



水泥地搭配水霧機使用

輔助化學防治

離地30公分以下之棲息與孳生場所，
採行殘效噴藥或護罩式噴灑法可大幅
降低成蟲與幼蟲的族群數量。



護罩式(或綠籬)噴灑法

孳生場所施用生長調節劑



配合藻類防治以杜絕幼蟲成長

N.G效果 不能做

以熱煙霧噴灑法並使用除蟲菊類殺蟲只能驅趕、無法確實撲滅小黑蚊。如同在戶外點蚊香，除了無法達到降低危害的效果，反而會造成族群的擴散。



教育部與您攜手遠離小黑蚊